

**Материалы для проведения  
регионального этапа**

**XLIII ВСЕРОССИЙСКОЙ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ**

**2016–2017 учебный год**

**Первый день**

**30–31 января 2017 г.**

Москва, 2017

Сборник содержит материалы для проведения III этапа XLIII Всероссийской олимпиады школьников по математике. Задания подготовлены Центральной предметно-методической комиссией по математике Всероссийской олимпиады школьников.

Сборник составили: Н. Х. Агаханов, А. В. Антропов, Д. А. Белов, Н. В. Богачёв, И. И. Богданов, С. Г. Волчёнков, А. А. Гаврилюк, Н. А. Гладков, М. А. Григорьев, О. Ю. Дмитриев, В. Л. Дольников, Л. А. Емельянов, Г. К. Жуков, А. П. Зимин, П. А. Кожевников, А. С. Кузнецов, Ю. В. Кузьменко, С. О. Кудря, В. Д. Лучкин, Е. Г. Молчанов, О. С. Нечаева, Б. А. Обухов, О. К. Подлипский, И. С. Рубанов, К. А. Сухов, Д. А. Терёшин, А. Д. Труфанов, М. А. Фадин, И. И. Фролов, Д. Г. Храмцов, Г. Р. Челноков, О. И. Южаков, А. Г. Якубов.

В скобках после каждой задачи указана фамилия её автора.

Рецензент: д. ф.-м. н. Р. Н. Карасёв.

Компьютерный макет: И. И. Богданов.

## ВВЕДЕНИЕ

### Порядок проведения, методика и система оценивания (проверки) регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2016–2017 учебного года.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 2016–2017 учебного года проводится по заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в единые для всех субъектов РФ сроки: **30 января 2017 г.** (I тур) и **31 января 2017 г.** (II тур). Региональный этап проводится по отдельным заданиям для учащихся 9, 10 и 11 классов.

Задания для каждого класса включают 8 задач — по 4 задачи в каждом из двух дней (туров) Олимпиады (задачи 1–4 — I тур, задачи 5–8 — II тур). Продолжительность каждого тура для каждого класса составляет 4 астрономических часа.

В силу того, что во всех субъектах Российской Федерации региональный этап проводится по одним и тем же заданиям, подготовленным Центральной предметно-методической комиссией, в целях предотвращения преждевременного доступа к текстам заданий со стороны участников Олимпиады, а также их учителей и наставников, время начала и окончания туроров в установленные даты в каждом субъекте РФ должно определяться в соответствии с «**Временными регламентами проведения туроров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в субъектах Российской Федерации в 2016–2017 учебном году**» для часовных поясов.

Показ работ, проведение апелляций и разбор задач в субъектах Российской Федерации, где тур оканчивается в 16.00 и 17.00 по местному времени, проводятся не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

В остальных субъектах Российской Федерации рекомендуется также осуществлять показ работ и проведение апелляций не раньше, чем на следующий день после проведения второго тура Олимпиады.

Победители и призёры олимпиады определяются Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников и Требованиями к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике в 2016–2017 учебном году.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, равно 56 (28 — I тур, 28 — II тур).

Задания математических олимпиад являются творческими, допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, необ-

ходимо оценивать частичные продвижения в задачах (например, разбор важного случая, доказательство вспомогательного утверждения, нахождение примера и т.п.). Наконец, возможны логические и арифметические ошибки в решениях. Окончательные баллы по задаче должны учитывать всё вышеперечисленное.

Ниже приведена стандартная методика оценивания решений.

Баллы	Правильность (ошибочность) решения
7	Полное верное решение.
6–7	Верное решение, но имеются небольшие недочёты, в целом не влияющие на решение.
5–6	Решение в целом верное. Однако оно содержит ошибки, либо пропущены случаи, не влияющие на логику рассуждений.
3–4	В том случае, когда решение задачи делится на две равнозначные части — решение одной из частей.
2–3	Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.
0–1	Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0	Решение неверное, продвижения отсутствуют.
0	Решение отсутствует.

Важно отметить, что любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снимать баллы за то, что текст решения слишком длинный, или за то, что верное решение школьника отличается от приведённого в данной методической разработке или от других решений, известных жюри. В то же время любой сколь угодно длинный текст, не содержащий полезных продвижений, должен быть оценен в 0 баллов.

Ниже приведены ответы и решения к задачам олимпиады. В комментариях к задачам указаны критерии оценивания (в баллах) некоторых предполагаемых ошибок и частичных продвижений. Заметим, что работа участника, помимо приведённых, может включать другие содержательные продвижения и ошибки, которые должны быть оценены дополнительно.

Желаем успешной работы!

Авторы и составители сборника

# УСЛОВИЯ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

## 9 класс

- 9.1. В произведении трёх натуральных чисел каждый сомножитель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом увеличиться ровно на 2016?

(Н. Агаханов, И. Богданов)

**Ответ.** Да, могло.

**Решение.** В качестве примера подходит произведение  $1 \cdot 1 \cdot 676$ . После указанной операции получается  $(-2) \cdot (-2) \cdot 673 = -2692 = 676 + 2016$ .

**Замечание.** Приведённый пример — единственный. Укажем, как его придумать. Предположим, что два из сомножителей равнялись 1, а третий —  $a$ . Их произведение было равно  $a$ , а после уменьшения превратилось в  $(-2)^2(a-3) = 4a-12$ . Значит, при  $4a-12 = a+2016$  условие соблюдается. Решая это уравнение, получаем  $a=676$ .

**Комментарий.** Только верный ответ — 0 баллов.

Предъявлен набор чисел, удовлетворяющий условию — 7 баллов.

Во в целом правильном решении из-за арифметической ошибки получен в качестве ответа набор 1, 1,  $a$ , где значение  $a$  ошибочно — 5 баллов.

- 9.2. Вася задумал 8 клеток шахматной доски, никакие две из которых не лежат в одной строке или в одном столбце. За ход Петя выставляет на доску 8 ладей, не бьющих друг друга, а затем Вася указывает все ладьи, стоящие на задуманных клетках. Если количество ладей, указанных Васей на этом ходе, чётно (т.е. 0, 2, 4, 6 или 8), то Петя выигрывает; иначе все фигуры снимаются с доски и Петя делает следующий ход. За какое наименьшее число ходов Петя сможет гарантированно выиграть?

(И. Богданов)

**Ответ.** За 2 хода.

**Решение.** Покажем сначала, как Петя выиграть за 2 хода. Первым ходом он выставит 8 ладей по диагонали доски. Если он ещё не выиграл, то на диагонали есть нечётное число заду-

манных Васей клеток. В частности, на ней есть как клетка  $A$ , задуманная Васей, так и клетка  $B$ , не задуманная им.

Пусть на втором ходу Петя поставит ладью на 6 диагональных клеток, кроме  $A$  и  $B$ , а также на клетки  $C$  и  $D$ , лежащие в тех же строках, что  $A$  и  $B$  соответственно, и в тех же столбцах, что  $B$  и  $A$  соответственно. Каждая новая ладья стоит или в одной строке, или в одном столбце с  $A$ , то есть их клетки Вася задумать не мог. Значит, в новой конфигурации ладей количество клеток, задуманных Васей, уменьшилось ровно на одну, то есть стало чётным, и Петя выиграл.

Осталось показать, что Петя не может гарантированно выиграть за один ход. Пусть у него это получилось. Переставив столбцы доски, можно считать, что он сделал первый ход так, как показано на рис. 1; тогда он не выиграет, если Васины клетки — отмеченные серым на том же рисунке.

**Комментарий.** Только верный ответ — 0 баллов.

Доказано только, что за один ход Петя не может выиграть — 1 балл.

Доказано только, что за два хода Петя может гарантированно выиграть — 6 баллов.

Приведён верный алгоритм, позволяющий Пете гарантированно выиграть за 2 хода (возможно, без обоснования и без доказательства невозможности гарантированного выигрыша за 1 ход) — не менее 4 баллов.

- 9.3. Существует ли треугольник со сторонами  $x$ ,  $y$  и  $z$  такой, что  $x^3 + y^3 + z^3 = (x+y)(y+z)(z+x)$ ?

(В. Сендеров)

**Ответ.** Нет, не существует.

**Первое решение.** Пусть такой треугольник существует. Можно считать, что  $x \geqslant y \geqslant z$ . Тогда по неравенству треугольника  $y+z > x$ , откуда

$$(x+y)(x+z)(y+z) > (x+y)(x+z)x = x^3 + x^2y + x^2z + xyz > x^3 + x^2y + x^2z \geqslant x^3 + y^3 + z^3.$$

Противоречие.




Рис. 1

**Замечание.** В подобном решении можно обойтись и без упорядочения переменных. Именно,

$$(x+y)(x+z)(y+z) = x^2(y+z) + y^2(x+z) + z^2(x+y) + 2xyz > \\ > x^2 \cdot x + y^2 \cdot y + z^2 \cdot z + 0$$

по неравенству треугольника.

**Второе решение.** Пусть такой треугольник существует. Отметим точки касания его сторон со вписанной окружностью. Пусть отрезки касательных от вершин до этих точек точек касания равны  $a, b$  и  $c$ , тогда  $x = b+c, y = a+c$  и  $z = a+b$ . Имеем

$$(x+y)(y+z)(z+x) = (a+2b+c)(a+b+2c)(2a+b+c) = \\ = 2(a^3 + b^3 + c^3) + 7(a^2b + ab^2 + a^2c + ac^2 + b^2c + bc^2) + 16abc$$

и

$$x^3 + y^3 + z^3 = (a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 = \\ = 2(a^3 + b^3 + c^3) + 3(a^2b + ab^2 + a^2c + ac^2 + b^2c + bc^2).$$

Значит, разность  $(x+y)(y+z)(z+x) - x^3 - y^3 - z^3$  после подстановки и приведения подобных слагаемых приобретает вид  $4(a^2b + ab^2 + a^2c + ac^2 + b^2c + bc^2) + 16abc$ , что, очевидно, больше 0. Противоречие.

**Замечание.** Существуют три положительных числа  $x, y, z$  такие, что равенство из условия выполнено — например,  $1, 1, 1 + \sqrt{5}$ . Таким образом, условие, что  $x, y, z$  являются длинами сторон треугольника, существенно.

**Комментарий.** Только верный ответ — 0 баллов.

Решения, содержащие существенные арифметические ошибки (например, неверные коэффициенты после раскрытия скобок во втором решении, приведённом выше), оцениваются не более, чем в 3 балла.

- 9.4. Равносторонний треугольник  $ABC$  вписан в окружность  $\Omega$  и описан вокруг окружности  $\omega$ . На сторонах  $AC$  и  $AB$  выбраны точки  $P$  и  $Q$  соответственно так, что отрезок  $PQ$  касается  $\omega$ . Окружность  $\Omega_b$  с центром  $P$  проходит через  $B$ , а окружность  $\Omega_c$  с центром  $Q$  проходит через  $C$ . Докажите, что окружности  $\Omega, \Omega_b$  и  $\Omega_c$  имеют общую точку.

(А. Акопян, П. Кожевников)

**Первое решение.** Пусть  $O$  — центр треугольника  $ABC$ , и пусть  $\omega$  касается отрезков  $BQ, QP$  и  $PC$  в точках  $K, L$  и  $M$

соответственно (см. рис. 2). В силу симметрии равностороннего треугольника прямые  $BO$  и  $CO$  проходят через точки  $M$  и  $K$  соответственно.

Отложим на луче  $LO$  отрезок  $OX$ , равный  $OA$  (так что  $X$  лежит на окружности  $\Omega$ ). Поскольку  $PL$  и  $PM$  — касательные к  $\omega$ , имеем  $\angle POL = \angle POM$ , а значит,  $\angle POB = \angle POX$ . Тогда треугольники  $POB$  и  $POX$  равны по двум сторонам ( $OB = OX$ , сторона  $OP$  — общая) и углу между ними. Итак,  $PX = PB$ , то есть точка  $X$  лежит на окружности  $\Omega_b$ . Аналогично,  $X$  лежит и на окружности  $\Omega_c$ .




Рис. 2




Рис. 3

**Второе решение.** Пусть  $O$  — центр треугольника  $ABC$ . Окружности  $\Omega$  и  $\Omega_b$  пересекаются в точке  $B$ . Вторая точка их пересечения — обозначим её через  $B'$  — симметрична точке  $B$  относительно линии центров  $PO$  (см. рис. 3). Аналогично, вторая точка пересечения окружностей  $\Omega$  и  $\Omega_c$  — это точка  $C'$ , симметричная точке  $C$  относительно  $QO$ .

Мы докажем, что  $B' = C'$  (тогда эта точка и будет общей у трёх окружностей). Имеем  $OB' = OB = OC = OC'$ ; значит, достаточно понять, что  $\angle BOB' + \angle COC' = \angle BOC (= 120^\circ)$ . Поскольку прямые  $PO$  и  $QO$  — биссектрисы углов  $BOB'$  и  $COC'$ , последнее равенство равносильно равенству  $\angle POQ = 60^\circ$ .

Это равенство нехитро проверяется. Так как  $\angle A = 60^\circ$ , то  $\angle BQP + \angle CPQ = 240^\circ$ , поэтому  $\angle POQ = 180^\circ - (\angle OQP + \angle OPQ) = 180^\circ - (\angle BQP + \angle CPQ)/2 = 60^\circ$ , что и требовалось.

**Комментарий.** Только за подсчёт некоторых углов без

дальнейших продвижений (например, если доказано только, что  $\angle POQ = 60^\circ$ ) баллы не ставятся.

Задача сведена к следующему утверждению (или эквивалентному ему): точка, симметричная  $B$  относительно  $PO$ , и точка, симметричная  $C$  относительно  $PO$ , совпадают — 3 балла.

Базовые факты про правильный треугольник (например, совпадение центров вписанной и описанной окружностей, его симметричность относительно биссектрис и т.п.) принимаются без доказательства.

## 10 класс

- 10.1. В произведении пяти натуральных чисел каждый сомножитель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом увеличиться ровно в 15 раз? (Н. Агаханов, И. Богданов)

**Ответ.** Да, могло.

**Решение.** В качестве примера подходит произведение  $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 48$ . После указанной операции получается  $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot 45 = 720 = 15 \cdot 48$ .

**Замечание.** Приведённый пример — единственный. Укажем, как его придумать. Предположим, что четыре из сомножителей равнялись 1, а пятый —  $a$ . Их произведение было равно  $a$ , а после уменьшения превратилось в  $(-2)^4(a-3) = 16a - 48$ . Значит, при  $16a - 48 = 15a$  условие соблюдается. Решая это уравнение, получаем  $a = 48$ .

**Комментарий.** Только верный ответ — 0 баллов.

Предъявлен набор чисел, удовлетворяющий условию — 7 баллов.

Во в целом правильном решении из-за арифметической ошибки получен в качестве ответа набор 1, 1, 1, 1,  $a$ , где значение  $a$  ошибочно — 5 баллов.

- 10.2. Окружность с центром в точке  $I$  вписана в четырёхугольник  $ABCD$ . Лучи  $BA$  и  $CD$  пересекаются в точке  $P$ , а лучи  $AD$  и  $BC$  пересекаются в точке  $Q$ . Известно, что точка  $P$  лежит на окружности  $\omega$ , описанной около треугольника  $AIC$ . Докажите, что точка  $Q$  тоже лежит на окружности  $\omega$ . (А. Кузнецов)

**Решение.** Так как четырёхугольник  $AICP$  вписанный, то  $\angle PCI = 180^\circ - \angle PAI = \angle BAI$ ; иначе говоря,  $\angle DCI = \angle BAI$  (см. рис. 4). Центр  $I$  вписанной окружности четырёхугольника лежит на биссектрисах его углов, поэтому  $\angle DCI = \angle BCI$  и  $\angle DAI = \angle BAI$ . Отсюда следует, что  $\angle DAI = \angle BCI$ , а значит,  $\angle QAI = \angle BCI = 180^\circ - \angle QCI$ .

Из полученного равенства вытекает, что четырёхугольник  $AICQ$  вписанный. Тем самым, точка  $Q$  лежит на окружности  $\omega$  (проходящей через точки  $A$ ,  $I$  и  $C$ ).

**Комментарий.** Доказано только, что  $\angle DAI = \angle DCI = \angle BAI = \angle BCI$  или что  $\angle BAD = \angle BCD$  — 3 балла.




Рис. 4

(Только за доказательство равенства  $\angle DCI = \angle BAI$  баллы не начисляются.)

Доказано, что четырёхугольник  $ABCD$  симметричен относительно  $BD$  — не менее 5 баллов.

(За утверждение о том, что  $ABCD$  симметричен относительно  $BD$ , без доказательства или с неправильным доказательством баллы не начисляются.)

- 10.3. Паша выбрал 2017 (не обязательно различных) натуральных чисел  $a_1, a_2, \dots, a_{2017}$  и играет сам с собой в следующую игру. Изначально у него есть неограниченный запас камней и 2017 больших пустых коробок. За один ход Паша добавляет в любую коробку (по своему выбору)  $a_1$  камней, в любую из оставшихся коробок (по своему выбору) —  $a_2$  камней, ..., наконец, в оставшуюся коробку —  $a_{2017}$  камней. Пашина цель — добиться того, чтобы после некоторого хода во всех коробках стало поровну камней. Мог ли он выбрать числа так, чтобы цели можно было добиться за 43 хода, но нельзя — за меньшее ненулевое число ходов?

(И. Богданов)

**Ответ.** Да, мог.

**Решение.** Заметим, что  $2017 = 43 \cdot 46 + 39$ . Приведём пример Пашиных чисел, при которых требуемое выполняется. Пусть среди его чисел будут 39 двоек, 46 чисел, равных 44, а остальные — единицы.

Чтобы добиться требуемого за 43 хода, Паша выбирает 39 коробок, в которые он всегда кладёт по 2 камня — через 43 хода в них окажется по  $43 \cdot 2 = 86$  камней. Остальные коробки он разбивает на 43 группы по 46 коробок; на  $i$ -м ходу он положит по 44 камня во все коробки  $i$ -й группы и по одному камню — в

коробки остальных групп. Тогда через 43 хода в каждой коробке каждой группы будет по  $44 + 42 \cdot 1 = 86$  камней, то есть во всех коробках будет поровну камней.

Осталось доказать, что за меньшее число ходов требуемое невыполнимо. Пусть Паша сделал  $k < 43$  ходов. Тогда в какую-то коробку  $A$  попало 44 камня на одном ходу, и в ней будет не меньше, чем  $44 + (k - 1) \cdot 1 = 43 + k$  камней. С другой стороны, поскольку  $46k < 2017$ , в какую-то коробку  $B$  ни на одном из ходов не попадёт 44 камня, то есть в ней будет не больше  $2k$  камней. Поскольку  $k < 43$ , имеем  $2k < k + 43$ , а значит, в коробке  $B$  меньше камней, чем в  $A$ . Таким образом, Паша ещё не добился требуемого.

**Замечание.** Приведённый пример — не единственный. Например, подойдёт также набор чисел, состоящий из 42 единиц,  $2017 - 43 = 1974$  чисел, равных  $a > 1$ , и одного числа, равного  $43a - 42$ . Существуют даже примеры с попарно различными числами; однако проверка того, что они подходят, несколько труднее, чем для примеров, приведённых выше.

**Комментарий.** Только верный ответ — 0 баллов.

Только предъявлен верный пример набора чисел  $a_1, a_2, \dots, a_{2017} - 3$  балла.

Предъявлен верный пример набора чисел  $a_1, a_2, \dots, a_{2017}$  и проверено, что можно уравнять количества камней в коробках за 43 хода (но нет доказательства того, что невозможно уравнять менее чем за 43 хода) — 4 балла.

Предъявлен верный пример набора чисел  $a_1, a_2, \dots, a_{2017}$  и доказано, что невозможно уравнять количества камней в коробках менее чем за 43 хода (без проверки того, что можно уравнять за 43 хода) — 5 баллов.

(Вышеупомянутые баллы могут быть снижены, если проверка оставшегося недоказанным утверждения затруднительна.)

Только идея конструирования нужного набора  $a_1, a_2, \dots, a_{2017}$  с несколькими «большими»  $a_i$  (создающими препятствия для уравнивания за малое число ходов) — 1 балл.

- 10.4. Учитель собирается дать детям задачу следующего вида. Он сообщит им, что он задумал многочлен  $P(x)$  степени 2017 с целы-

ми коэффициентами, старший коэффициент которого равен 1. Затем он сообщит им  $k$  целых чисел  $n_1, n_2, \dots, n_k$ , и отдельно сообщит значение выражения  $P(n_1) \cdot P(n_2) \cdot \dots \cdot P(n_k)$ . По этим данным дети должны найти многочлен, который мог бы задумать учитель. При каком наименьшем  $k$  учитель сможет составить задачу такого вида так, чтобы многочлен, найденный детьми, обязательно совпал бы с задуманным?

(Г. Жуков)

**Ответ.** При  $k = 2017$ .

**Решение.** Сначала докажем, что  $k > 2016$ . Пусть учитель использовал некоторое  $k \leq 2016$ , задумав многочлен  $P(x)$ . Рассмотрим многочлен  $Q(x) = P(x) + (x - n_1)(x - n_2) \dots (x - n_k)$ . Заметим, что степень многочлена  $Q(x)$  также равна 2017, а его старший коэффициент также равен 1. При этом  $P(n_1)P(n_2) \dots P(n_k) = Q(n_1)Q(n_2) \dots Q(n_k)$ , но  $P(x) \neq Q(x)$ . Значит, дети могли бы найти многочлен  $Q(x)$  вместо  $P(x)$ , то есть учитель не добился требуемого.

Осталось доказать, что при  $k = 2017$  учитель сможет придумать требуемую задачу.

**Лемма.** Пусть  $P(x)$  — многочлен с целыми коэффициентами, и пусть  $a$  и  $b$  — различные целые числа. Тогда  $P(a) - P(b)$  делится на  $a - b$ .

**Доказательство.** В разности  $P(a) - P(b)$  сгруппируем слагаемые по степеням: если  $P(x) = p_n x^n + p_{n-1} x^{n-1} + \dots + p_1 x + p_0$ , то  $P(a) - P(b) = p_n(a^n - b^n) + p_{n-1}(a^{n-1} - b^{n-1}) + \dots + p_1(a - b)$ , где каждое слагаемое делится на  $a - b$ .  $\square$

Пусть  $k = 2017$ . Положим  $n_i = 4i$  при  $i = 1, 2, \dots, k$ ; пусть учитель сообщит детям, что  $P(n_1)P(n_2) \dots P(n_k) = 1$ . Тогда многочлен  $P(x) = (x - n_1)(x - n_2) \dots (x - n_k) + 1$  под условие подходит. Предположим, что ещё какой-то многочлен  $Q(x)$  также подходит под условие. Тогда, так как  $Q(n_1)Q(n_2) \dots Q(n_k) = 1$  и коэффициенты многочлена  $Q(x)$  — целые числа, то  $Q(n_i) = \pm 1$  при любом  $i = 1, 2, \dots, k$ .

Если найдутся  $i$  и  $j$  такие, что  $Q(n_i) = 1$ , а  $Q(n_j) = -1$ , то разность  $Q(n_i) - Q(n_j) = 2$  не делится на  $n_i - n_j$ , что противоречит лемме. Поэтому все значения  $Q(n_i)$  равны между собой и все равны либо 1, либо  $-1$ . Однако все значения не могут быть равны  $-1$ , так как в произведении  $Q(n_1)Q(n_2) \dots Q(n_k)$

множителей нечетное количество и произведение было бы равно  $-1$ . Значит,  $Q(n_i) = 1$  при любом  $i = 1, 2, \dots, k$ . Тогда разность  $P(x) - Q(x)$  — многочлен степени менее  $k$ , имеющий хотя бы  $k$  корней, то есть этот многочлен тождественно равен 0, и  $P(x) = Q(x)$ . Противоречие.

**Замечание.** С использованием леммы можно показать, что многочлен  $P(x) = (x - n_1)(x - n_2) \dots (x - n_{2017}) \pm 1$  подходит при *любых* различных целых числах  $n_1, n_2, \dots, n_{2017}$ .

**Комментарий.** Только верный ответ — 0 баллов.

Полное решение задачи состоит из двух частей:

(a) доказательство того, что требуемого нельзя добиться при  $k \leq 2016$  — оценивается из 2 баллов;

(б) доказательство того что при  $k = 2017$  требуемого добиться можно — оценивается из 5 баллов.

Если в части (б) предъявлен многочлен  $P(x) = (x - n_1)(x - n_2) \dots (x - n_k) \pm 1$  (при некоторых различных целых  $n_1, n_2, \dots, n_k$ ), но не доказано, что никакой другой многочлен  $Q(x)$  не удовлетворяет условию — 2 балла (из пяти).

За использование леммы о делимости  $P(a) - P(b)$  на  $a - b$  без доказательства баллы не снимаются.

## 11 класс

- 11.1. В произведении семи натуральных чисел каждый сомножитель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом увеличиться ровно в 13 раз?  
(Н. Агаханов, И. Богданов)

**Ответ.** Да, могло.

**Решение.** В качестве примера подходит произведение  $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 16 = 32$ . После указанной операции получается  $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-1) \cdot 13 = 13 \cdot 32$ .

**Замечание 1.** Укажем, как придумать этот пример. Предположим, что пять из сомножителей равнялись 1, шестой — 2, а седьмой —  $a$ . Их произведение было равно  $2a$ , а после уменьшения превратилось в  $(-2)^5(-1)(a-3) = 32a - 96$ . Значит, при  $32a - 96 = 26a$  условие соблюдается. Решая это уравнение, получаем  $a = 16$ . Итак, числа 1, 1, 1, 1, 1, 2, 16 удовлетворяют требованиям.

**Замечание 2.** Приведённый пример — не единственный. Например, подойдёт также произведение  $1^4 \cdot 29 \cdot 61 \cdot 64$ , после вычитания переходящий в  $(-2)^4 \cdot 26 \cdot 58 \cdot 61$ .

**Комментарий.** Только верный ответ — 0 баллов.

Предъявлен набор чисел, удовлетворяющий условию — 7 баллов.

Во в целом правильном решении из-за арифметической ошибки получен в качестве ответа набор 1, 1, 1, 1, 1, 2,  $a$ , где значение  $a$  ошибочно — 5 баллов.

- 11.2. Вася задумал 8 клеток шахматной доски, никакие две из которых не лежат в одной строке или в одном столбце. За ход Петя выставляет на доску 8 ладей, не бьющих друг друга, а затем Вася указывает все ладьи, стоящие на задуманных клетках. Если количество ладей, указанных Васей на этом ходе, чётно (т.е. 0, 2, 4, 6 или 8), то Петя выигрывает; иначе все фигуры снимаются с доски и Петя делает следующий ход. За какое наименьшее число ходов Петя сможет гарантированно выиграть?

(И. Богданов)

**Ответ.** За 2 хода.

**Решение.** Покажем сначала, как Петя выиграть за 2 хода. Первым ходом он выставит 8 ладей по диагонали доски. Если

он ещё не выиграл, то на диагонали есть нечётное число задуманных Васей клеток. В частности, на ней есть как клетка  $A$ , задуманная Васей, так и клетка  $B$ , не задуманная им.

Пусть на втором ходу Петя поставит ладьи на 6 диагональных клеток, кроме  $A$  и  $B$ , а также на клетки  $C$  и  $D$ , лежащие в тех же строках, что  $A$  и  $B$  соответственно, и в тех же столбцах, что  $B$  и  $A$  соответственно. Каждая новая ладья стоит или в одной строке, или в одном столбце с  $A$ , то есть их клетки Вася задумать не мог. Значит, в новой конфигурации ладей количество клеток, задуманных Васей, уменьшилось ровно на одну, то есть стало чётным, и Петя выиграл.

Осталось показать, что Петя не может гарантированно выиграть за один ход. Пусть у него это получилось. Переставив столбцы доски, можно считать, что он сделал первый ход так, как показано на рис. 1; тогда он не выиграет, если Васины клетки — отмеченные серым на том же рисунке.

**Комментарий.** Только верный ответ — 0 баллов.

Доказано только, что за один ход Петя не может выиграть — 1 балл.

Доказано только, что за два хода Петя может гарантированно выиграть — 6 баллов.

Приведён верный алгоритм, позволяющий Пете гарантированно выиграть за 2 хода (возможно, без обоснования и без доказательства невозможности гарантированного выигрыша за 1 ход) — не менее 4 баллов.

- 11.3. Учитель собирается дать детям задачу следующего вида. Он сообщит им, что он задумал многочлен  $P(x)$  степени 2017 с целыми коэффициентами, старший коэффициент которого равен 1. Затем он сообщит им  $k$  целых чисел  $n_1, n_2, \dots, n_k$ , и отдельно сообщит значение выражения  $P(n_1) \cdot P(n_2) \cdot \dots \cdot P(n_k)$ . По этим данным дети должны найти многочлен, который мог бы задумать учитель. При каком наименьшем  $k$  учитель сможет составить задачу такого вида так, чтобы многочлен, найденный детьми, обязательно совпал бы с задуманным? (Г. Жуков)




Рис. 5

**Ответ.** При  $k = 2017$ .

**Решение.** Сначала докажем, что  $k > 2016$ . Пусть учитель использовал некоторое  $k \leq 2016$ , задумав многочлен  $P(x)$ . Рассмотрим многочлен  $Q(x) = P(x) + (x - n_1)(x - n_2) \dots (x - n_k)$ . Заметим, что степень многочлена  $Q(x)$  также равна 2017, а его старший коэффициент также равен 1. При этом  $P(n_1)P(n_2) \dots P(n_k) = Q(n_1)Q(n_2) \dots Q(n_k)$ , но  $P(x) \neq Q(x)$ . Значит, дети могли бы найти многочлен  $Q(x)$  вместо  $P(x)$ , то есть учитель не добился требуемого.

Осталось доказать, что при  $k = 2017$  учитель сможет придумать требуемую задачу.

**Лемма.** Пусть  $P(x)$  — многочлен с целыми коэффициентами, и пусть  $a$  и  $b$  — различные целые числа. Тогда  $P(a) - P(b)$  делится на  $a - b$ .

**Доказательство.** В разности  $P(a) - P(b)$  сгруппируем слагаемые по степеням: если  $P(x) = p_n x^n + p_{n-1} x^{n-1} + \dots + p_1 x + p_0$ , то  $P(a) - P(b) = p_n(a^n - b^n) + p_{n-1}(a^{n-1} - b^{n-1}) + \dots + p_1(a - b)$ , где каждое слагаемое делится на  $a - b$ .  $\square$

Пусть  $k = 2017$ . Положим  $n_i = 4i$  при  $i = 1, 2, \dots, k$ ; пусть учитель сообщит детям, что  $P(n_1)P(n_2) \dots P(n_k) = 1$ . Тогда многочлен  $P(x) = (x - n_1)(x - n_2) \dots (x - n_k) + 1$  под условие подходит. Предположим, что ещё какой-то многочлен  $Q(x)$  также подходит под условие. Тогда, так как  $Q(n_1)Q(n_2) \dots Q(n_k) = 1$  и коэффициенты многочлена  $Q(x)$  — целые числа, то  $Q(n_i) = \pm 1$  при любом  $i = 1, 2, \dots, k$ .

Если найдутся  $i$  и  $j$  такие, что  $Q(n_i) = 1$ , а  $Q(n_j) = -1$ , то разность  $Q(n_i) - Q(n_j) = 2$  не делится на  $n_i - n_j$ , что противоречит лемме. Поэтому все значения  $Q(n_i)$  равны между собой и все равны либо 1, либо  $-1$ . Однако все значения не могут быть равны  $-1$ , так как в произведении  $Q(n_1)Q(n_2) \dots Q(n_k)$  множителей нечетное количество и произведение было бы равно  $-1$ . Значит,  $Q(n_i) = 1$  при любом  $i = 1, 2, \dots, k$ . Тогда разность  $P(x) - Q(x)$  — многочлен степени менее  $k$ , имеющий хотя бы  $k$  корней, то есть этот многочлен тождественно равен 0, и  $P(x) = Q(x)$ . Противоречие.

**Замечание.** С использованием леммы можно показать, что

многочлен  $P(x) = (x - n_1)(x - n_2) \dots (x - n_{2017}) \pm 1$  подходит при любых различных целых числах  $n_1, n_2, \dots, n_{2017}$ .

**Комментарий.** Только верный ответ — 0 баллов.

Полное решение задачи состоит из двух частей:

(а) доказательство того, что требуемого нельзя добиться при  $k \leq 2016$  — оценивается из 2 баллов;

(б) доказательство того что при  $k = 2017$  требуемого добиться можно — оценивается из 5 баллов.

Если в части (б) предъявлен многочлен  $P(x) = (x - n_1)(x - n_2) \dots (x - n_k) \pm 1$  (при некоторых различных целых  $n_1, n_2, \dots, n_k$ ), но не доказано, что никакой другой многочлен  $Q(x)$  не удовлетворяет условию — 2 балла (из пяти).

За использование леммы о делимости  $P(a) - P(b)$  на  $a - b$  без доказательства баллы не снимаются.

11.4. Равносторонний треугольник  $ABC$  вписан в окружность  $\Omega$  и описан вокруг окружности  $\omega$ . На сторонах  $AC$  и  $AB$  выбраны точки  $P$  и  $Q$  соответственно так, что отрезок  $PQ$  проходит через центр треугольника  $ABC$ . Окружности  $\Gamma_b$  и  $\Gamma_c$  построены на отрезках  $BP$  и  $CQ$  как на диаметрах. Докажите, что окружности  $\Gamma_b$  и  $\Gamma_c$  пересекаются в двух точках, одна из которых лежит на  $\Omega$ , а другая — на  $\omega$ .  
(А. Акопян)

**Решение.** Пусть  $O$  — центр треугольника  $ABC$ . Обозначим через  $B_2$  и  $C_2$  точки касания  $\omega$  с  $AC$  и  $AB$  соответственно, а через  $B_1$  и  $C_1$  — точки  $\Omega$ , диаметрально противоположные точкам  $B$  и  $C$  соответственно (см. рис. 6). Тогда точки  $B_1$  и  $C_1$  симметричны  $O$  относительно сторон  $AC$  и  $AB$  соответственно, откуда  $\angle OB_1P = \angle B_1OP$  и  $\angle OC_1Q = \angle C_1OQ$ .

Пусть лучи  $B_1P$  и  $C_1Q$  пересекают  $\Omega$  в точках  $B'$  и  $C'$  соответственно; тогда  $\angle PB'B = \angle B_1B'B = 90^\circ$ , то есть  $B'$  лежит на  $\Gamma_b$ . Аналогично,  $C'$  лежит на  $\Gamma_c$ . С другой стороны,  $\overline{BB'} + \overline{CC'} = 2(\angle BB_1B' + \angle CC_1C') = 2(\angle B_1OP + \angle C_1OQ) = 2(180^\circ - \angle B_1OC_1) = 120^\circ = \overline{BC}$ ; это означает, что точки  $B'$  и  $C'$  совпадают. Итак,  $\Gamma_b$  и  $\Gamma_c$  пересекаются в точке  $B'$ , лежащей на  $\Omega$ .

Поскольку  $\angle BB_2P = \angle CC_2Q = 90^\circ$ , точки  $B_2$  и  $C_2$  лежат на  $\Gamma_b$  и  $\Gamma_c$  соответственно. Пусть продолжение отрезка  $B'O$  за




Рис. 6

точку  $O$  пересекает  $\omega$  в точке  $X$ . Тогда  $OX = OB_2 = OC_2$  и  $OB' = OB = OC$ , откуда  $OB \cdot OB_2 = OB' \cdot OX = OC \cdot OC_2$ . Первое из этих равенств означает, что точки  $B, B_2, B'$  и  $X$  лежат на одной окружности, то есть  $X$  лежит на окружности  $\Gamma_b$ . Аналогично, из второго равенства следует, что  $X$  лежит на  $\Gamma_c$ . Значит,  $X$  является второй точкой пересечения  $\Gamma_b$  и  $\Gamma_c$ , лежащей на  $\omega$ .

**Замечание 1.** После доказательства того, что окружности  $\Omega$ ,  $\Gamma_b$  и  $\Gamma_c$  пересекаются в одной точке  $B'$ , можно завершить решение и по-другому. Пусть  $X$  – вторая точка пересечения  $\Gamma_b$  и  $\Gamma_c$ . Нетрудно видеть, что точка  $X$  лежит в угле  $C_2OB_2$ . Тогда  $\angle B_2XC_2 = \angle B_2XB' + \angle C_2XB' = (180^\circ - \angle B_2PB') + (180^\circ - \angle C_2QB') = (90^\circ - \angle PB_1O) + (90^\circ - \angle QC_1O) = 120^\circ$ , что и означает, что  $X$  лежит на  $\omega$ .

**Замечание 2.** Пусть прямая  $PQ$  пересекает прямую  $BC$  в точке  $R$ . Аналогично можно показать, что окружность  $\Gamma_a$  с диаметром  $AR$  также проходит через две общих точки  $B'$  и  $X$  окружностей  $\Gamma_b$  и  $\Gamma_c$ .

**Комментарий.** Показано только, что окружности  $\Gamma_b$  и  $\Gamma_c$  пересекаются в двух точках – 0 баллов.

Показано только, что одна из точек пересечения этих окружностей лежит на  $\Omega$  – 3 балла.

Показано только, что одна из точек пересечения этих окружностей лежит на  $\omega$  – 4 балла.